



ОРГАНИЗАЦИЯ ГОТОВНОСТИ

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ К

ЭКСТРЕННОЙ ТЕРАПИИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ

ГИПЕРТЕРМИИ



БОЯРКОВ А.В


ММКЦ КОММУНАРКА

ОМО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И
РЕАНИМАЦИИ НИИОЗМ

Синдром злокачественной гипертермии


- Редкое наследственное потенциально фатальное заболевание скелетных мышц, проявляющееся характерной гиперметаболической реакцией вследствие неконтролируемого увеличения уровня внутриклеточного Ca^{2+} в миоцитах
- Причиной является дефект гена, кодирующего рианодиновый рецептор 1 типа RyR1
- Относится к числу орфанных заболеваний
- Триггеры: Ингаляционные анестетики, деполяризующие миорелаксанты
- Встречаемость 1:4000-15000





Синдром злокачественной гипертермии

- 1960 год Австралия студент с переломом ноги
- 10 из 24 родственников умерли во время анестезии
- Свинья Лэндреса в ЮАР 1968 год
- 1969 год теория актин-миозин
- 1970 США кофеин-галотановый тест
- 1980 год FDA одобряет дантролен для анестезиологической практики





16.09.25 № 01-04/2306

5. Главным внештатным специалистам – анестезиологам-реаниматологам субъектов РФ наладить централизованный статистический учет случаев злокачественной гипертермии, вызванной анестезией, оценить региональную доступность Дантролена и состояние отчетности по ее использованию. На основании полученных сведений в сотрудничестве с главным внештатным специалистом – анестезиологом –реаниматологом Минздрава РФ и Комитетом по злокачественной гипертермии Федерации анестезиологов и реаниматологов (ФАР) разработать регламент действий в случае подозрения на злокачественную гипертермию, вызванную анестезией, во вверенном субъекте Российской Федерации.

Срок: до 1 апреля 2026 г.

**Главный внештатный специалист
по анестезиологии-реаниматологии
Минздрава России, директор,
д.м.н., профессор**

С.В. Царенко

**Главный внештатный специалист
по анестезиологии-реаниматологии
Минздрава России, директор,
д.м.н., профессор**

С.В. Царенко



Регион	Тип системы депо	Доставка
Мурманская область	1 головное депо (МОКБ) + 1 филиал с полным запасом	МОКБ своими силами (область); сама больница (Мурманск)
Республика Тыва	1 единое депо (Республиканская больница №1)	Бригада скорой помощи (РЦСМП и медицины катастроф)
Москва	1 депо на станции скорой (им. Пучкова)	Выездные бригады скорой с ближайшей подстанции
Алтайский край	Многоуровневая: головное депо (Барнаул) + 7 межрайонных депо	СМП (Барнаул); санитарная авиация/спецтранспорт ТЦМК (край)

+ Санкт-Петербург!

**HOT
NEWS**



В 17 регионах проекты приказов находятся на рассмотрении в минздравах: Красноярский край, Республика Хакасия (Абакан), Санкт-Петербург, Новосибирская область, Удмуртская Республика (Ижевск), Нижегородская область, Оренбургская область, Республика Алтай (Горно-Алтайск), Алтайский край (Барнаул), Челябинская область, Республика Татарстан (Казань), Свердловская область (Екатеринбург), Тюменская область





ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

« 03 » 11 2022 г.

№ 1038

О порядке обеспечения
медицинских организаций
государственной системы
здравоохранения города
Москвы стационарного типа
лекарственным препаратом
Дантролен

В целях своевременного и полноценного оказания специализированной медицинской помощи пациентам при развитии синдрома злокачественной гипертермии в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь стационарного типа, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Регламент передачи лекарственного препарата Дантролен в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы (далее – Регламент, приложение 1 к настоящему приказу).

1.2. Форму акта приема-передачи лекарственного препарата Дантролен в медицинскую организацию (приложение 2 к настоящему приказу).

1.3. Форму акта возврата неиспользованных флаконов лекарственного препарата Дантролен из медицинской организации в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы (приложение 3 к настоящему приказу).

1.4. Форму протокола проведения терапии лекарственным препаратом Дантролен (приложение 4 к настоящему приказу).

1.5. Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы стационарного типа, в которых обеспечивается наличие лекарственного препарата Дантролен (приложение 5 к настоящему приказу).

2. Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, перечисленным в приложении 5 к настоящему приказу обеспечить наличие во вверенном структурном подразделении стартовой дозы лекарственного препарата Дантролен в количестве 6 флаконов по 20 мг.

3. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы **Плаунову Н.Ф.**:

3.1. Обеспечить силами выездных бригад скорой медицинской помощи доставку лекарственного препарата Дантролен в соответствии с утвержденным Регламентом (приложение 1 к настоящему приказу).

3.2. Предоставлять отчетные данные об использовании лекарственного препарата Дантролен в Департамент здравоохранения города Москвы.

Срок: ежемесячно

4. Главному внештатному специалисту по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения города Москвы **Проценко Д.Н.** и главному внештатному детскому специалисту по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения города Москвы **Афукову И.И.** обеспечить методическое руководство и контроль обоснованности применения лекарственного препарата Дантролен в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы стационарного типа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы **Токарева А.С.**


Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы

А.И. Хрипун







Проект «Дантролен»*



СТАЦИОНАР ВЫЗОВА
При выявлении
пациента со
злокачественной
гипертермией

Оповещение ЦКС по
тел. 8(495)620-42-71

Применяет начальную дозу



* Регламент передачи лекарственного препарата «Дантролен» в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы (утвержден приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 3.11.2022 г. №1038)



Клинические рекомендации

Злокачественная гипертермия, вызванная анестезией

МКБ-10: T88.3

Год утверждения (частота пересмотра): 2023 (пересмотр каждые 3 года)

ID:

URL:

Профессиональные ассоциации:

- Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»

Утверждены

Общероссийской общественной организацией
«Федерация анестезиологов и реаниматологов»

_____ 2023г.

Согласованы

Научным советом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации
_____ 202_ г.

Термины и определения

Злокачественная гипертермия (ЗГ), вызванная анестезией (класс МКБ-10 T88.3) – редкое (орфанное) заболевание (п. 271 в списке Министерства здравоохранения РФ), наследуемый синдром, при котором применение летучих ингаляционных анестетиков и/или сукцинилхолина вызывает острый генерализованный гиперметаболизм скелетных мышц с повышенным потреблением кислорода, продукцией большого объема углекислого газа, лактата и тепла, без специфического лечения приводящий к массивному рабдомиолизу и полиорганной недостаточности с крайне высокой летальностью. Термины «синдром ЗГ» или «криз ЗГ» полностью аналогичны «злокачественной гипертермии, вызванной анестезией».

Фармакогенетическое заболевание – наследственное заболевание, при котором развитие клинических проявлений происходит в результате контакта пациента с определенным препаратом или группой медикаментов по механизму, отличному от реакций гиперчувствительности.

Триггерные препараты – препараты, способные запускать патогенетический механизм того или иного фармакогенетического заболевания. Применительно к ЗГ ими являются все применяемые сегодня летучие ингаляционные анестетики и деполяризующий миорелаксант сукцинилхолин. В качестве лабораторных триггеров используют галотан и кофеин. Закись азота, ксенон, все недеполяризующие миорелаксанты, все неингаляционные и все местные анестетики не являются триггерными препаратами ЗГ.

Предрасположенность к злокачественной гипертермии (ПЗГ) – фармакогенетическое заболевание, протекающее в виде клинически слабо выраженной или вовсе бессимптомной миопатии, со значительной генетической неоднородностью (описано более 230 генных мутаций), которое под воздействием триггерных препаратов, обычно применяемых для общей анестезии, проявляет себя в виде ЗГ [1].

Общая анестезия – вид анестезии, искусственно вызванное обратимое состояние торможения центральной нервной системы, при котором возникает потеря сознания и памяти, снижение болевой чувствительности и некоторых рефлексов, а также расслабление скелетных мышц.

Безопасные препараты

- Закись азота
- Ксенон
- Барбитураты
- Бензодиазепины
- Пропофол
- Кетамин
- Опиоиды
- Все недеполяризующие миорелаксанты
- Все местные анестетики



Триггерные препараты

Сукцинилхолин Диэтиловый эфир
Метоксифлуран Галотан Энфлуран
Изофлуран Десфлуран
Севофлуран Кофеин



Клинический случай



- Пациентка М. 38 лет
- В анамнезе не было операций в условиях общей анестезии
- Общая анестезия + эпидуральная анальгезия
- Possum let 2.30%, заболеваемость 12.79%.
- ASA II
- Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы, спленэктомия, холецистэктомия





Начало операции 8:50

Повышение $e\text{CO}_2$ до 52-54

Тахикардия, CO_2 ,
анурия, лактат
ацидоз



Т 37,6

Т 38,6



Тахикардия, CO₂,
анурия, лактат
ацидоз

Повышение eCO₂ до 52-54

Триггеры

10:50

11:00

11:15

12:00

12:30

14:00

16:00

Т 37,6

Т 38,6

ЦКС

3.1.3 Гипервентиляция легких с высоким потоком кислорода

- Тотчас вслед за прекращением введения всех триггеров пациенту со злокачественной гипертермией следует начать гипервентиляцию легких (увеличение минутной вентиляции легких не менее чем в 3 раза) с высоким потоком кислорода (>10 л/мин) [10, 11, 55, 57].

3.1.2 Прекращение введения всех триггерных препаратов

- При манифестации злокачественной гипертермии, связанной с анестезией, рекомендовано прежде всего немедленно прекратить введение пациенту всех триггерных препаратов [10, 11, 46, 55, 57].

3.1.11 Обеспечение мониторинга

- У пациента со злокачественной гипертермией для обеспечения адекватного мониторинга рекомендуется оценивать в реальном времени следующие показатели: пульсоксиметрия (SpO₂); капнография (P_{ET}CO₂); ЭКГ; температура ядра и оболочки тела; неинвазивное измерение артериального давления (НИАД); газы и КОС артериальной крови; уровни гематокрита и тромбоцитов; коагулограмма [10, 11, 13, 55, 57].





Индукция анестезии

Севофлуран включен в 10:00

- Рокуроний
- Пропофол
- Фентанил
- После индукции анестезия поддерживалась пропофолом до 10:00





В 1 флаконе дантролена: 20 мг / 60 мл = 1 мг / 3 мл


Пациент с массой тела 70 кг:
от 2,5 мг/кг = 175 мг или 525 мл (9 флаконов)




до 10 мг/кг = 700 мг или 2100 мл (35 флаконов)



T 39





Dantrolene sodium hemiheptahydrate 120 mg



Работа команды ОАР 1 по протоколу ЗГТ



Повышение
eCO₂ до 52-54

Повышение
eCO₂ до 72

Резерв ЦКС

10:50

11:00

11:15

12:00

12:30

14:00

16:00

Т 37,6

Т 38,6

ЦКС

Тахикардия, CO₂,
анурия, лактат
ацидоз

Дантролен

Т 39,0



Состояние полностью
стабилизировано

RADIOMETER ABL800 BASIC

ABL800 BASIC
РАПОРТ ПАЦИЕНТА Шт. №1 - S 195uL 10.27 15.08.2023
Проба # 12695

Идентификация
Порядковый No
Фамилия пациента МЕЛНИКОВА
Имя пациента
Тип пробы Артериальная
T 36,6 °C
FO2(i) 0,5 %

pH/газы крови
pH 7,366 [7,000 - 7,440]
↑ pCO2 53,2 mmHg [36,0 - 45,0]
↑ pO2 124 mmHg [80,0 - 100]

Оксиметрия
↓ ctHb 11,8 g/dL [12,0 - 16,0]
sO2 97,5 % [95,0 - 99,0]
FO2Hb 95,6 % [-]
FctHb 1,2 % [-]
FHHb 2,5 % [-]
FMetHb 0,7 % [-]

Электролиты
cK+ 4,9 mmol/L [3,5 - 5,0]
cNa+ 138 mmol/L [136 - 146]
cCa2+ 1,29 mmol/L [1,15 - 1,29]
↑ cCl- 108 mmol/L [98 - 106]

Метаболиты
↑ cGlu 10,1 mmol/L [3,9 - 5,8]
cLac 1,3 mmol/L [0,5 - 1,6]
cBil 7 μmol/L [-]

Параметры с температурной поправкой

pH(T).c 7,251
pCO2(T).c 52,2 mmHg
pO2(T).c 121 mmHg

Кислородный статус

ctO2.c 16,1 Vol%
p50.e 31,05 mmHg

Кисотно-щелочной статус

cBase(Ecf).c -3,9 mmol/L
cHCO3-(P.st).c -

RADIOMETER ABL800 BASIC

ABL800 BASIC
РАПОРТ ПАЦИЕНТА Шт. №1 - S 195uL 11.30 15.08.2023
Проба # 12697

Идентификация
Порядковый No 192078377128
Фамилия пациента МЕЛНИКОВА
Имя пациента И С
Тип пробы Артериальная
T 37,8 °C
FO2(i) 40,0 %

192078377128

pH/газы крови
pH 7,163 [7,000 - 7,440]
↑ pCO2 59,7 mmHg [36,0 - 45,0]
↑ pO2 104 mmHg [80,0 - 100]

Оксиметрия
ctHb 12,6 g/dL [12,0 - 16,0]
↑ sO2 99,1 % [95,0 - 99,0]
FO2Hb 97,4 % [-]
FctHb 0,7 % [-]
FHHb 0,9 % [-]
FMetHb 1,0 % [-]

Электролиты
↑ cK+ 5,1 mmol/L [3,5 - 5,0]
cNa+ 140 mmol/L [136 - 146]
cCa2+ 1,25 mmol/L [1,15 - 1,29]
↑ cCl- 108 mmol/L [98 - 106]

Метаболиты
↑ cGlu 9,8 mmol/L [3,9 - 5,8]
↑ cLac 3,5 mmol/L [0,5 - 1,6]
cBil 8 μmol/L [-]

Параметры с температурной поправкой

pH(T).c 7,172
pCO2(T).c 62,0 mmHg
pO2(T).c 108 mmHg

Кислородный статус

ctO2.c 18,0 Vol%
p50.e 30,40 mmHg

Кисотно-щелочной статус

cBase(Ecf).c -5,6 mmol/L
cHCO3-(P.st).c -8,7 mmol/L

RADIOMETER ABL800 BASIC

ABL800 BASIC
РАПОРТ ПАЦИЕНТА Шт. №1 - S 195uL 12.32 15.08.2023
Проба # 12699

Идентификация
Порядковый No 192078377117
Фамилия пациента МЕЛНИКОВА
Имя пациента ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Тип пробы Артериальная
T 36,8 °C
FO2(i) 89,0 %

после
гашения

pH/газы крови
pH 7,364 [7,000 - 7,440]
↓ pCO2 24,8 mmHg [36,0 - 45,0]
↑ pO2 140 mmHg [80,0 - 100]

Оксиметрия
ctHb 11,3 g/dL [12,0 - 16,0]
↑ sO2 99,9 % [95,0 - 99,0]
FO2Hb 98,1 % [-]
FctHb 0,8 % [-]
FHHb 0,1 % [-]
FMetHb 1,0 % [-]

Электролиты
cK+ 5,9 mmol/L [3,5 - 5,0]
↓ cNa+ 134 mmol/L [136 - 146]
cCa2+ 1,17 mmol/L [1,15 - 1,29]
↑ cCl- 109 mmol/L [98 - 106]

Метаболиты
↑ cGlu 11,3 mmol/L [3,9 - 5,8]
cLac 1,6 mmol/L [0,5 - 1,6]
cBil 9 μmol/L [-]

Параметры с температурной поправкой

pH(T).c 7,367
pCO2(T).c 24,5 mmHg
pO2(T).c 139 mmHg



Кислородный статус

ctO2.c 16,7 Vol%
p50.e 27,07 mmHg

Кисотно-щелочной статус

cBase(Ecf).c -5,0 mmol/L
cHCO3-(P.st).c -20,5 mmol/L

Регресс
СИМПТОМОВ



Повышение
eCO₂ до 52-
54

Триггеры


Повышение
eCO₂ до 72

резерв ЦК




Регресс
СИМПТОМОВ

Перевод
в ОРИТ



Timeline bar showing time slots: 10:50, 11:00, 11:15, 12:00, 12:30, 14:00, 16:00. A green arrow points to the 11:15 slot.

ЦКС **ЭКО**   полностью Экстубация

Тахикардия, CO₂,
анурия, лактат

T 37,6

T 38,6


ЦКС

Тахикардия, CO₂,
анурия, лактат
ацидоз

Дантролен




T 39,0



Состояние
полностью
стабилизировано

Экстубация
трахеи



RADIOMETER ABL800 BASIC		RADIOMETER ABL800 BASIC	
10:27	15.08.2023	11:35	15.08.2023
Проба #	12695	Проба #	12697
Идентификация		Идентификация	
Портальный №		Портальный №	
Фамилия пациента		Фамилия пациента	
Имя пациента		Имя пациента	
Тип пробы		Тип пробы	
Результат		Результат	
pH крови		pH крови	
pCO2		pCO2	
pO2		pO2	
Оксиметрия		Оксиметрия	
SpO2		SpO2	
Electrolytes		Electrolytes	
Metabolites		Metabolites	
Parameters with temperature correction		Parameters with temperature correction	
Oxygen saturation		Oxygen saturation	
Acid-base status		Acid-base status	

Повышение eCO2 до 52-54

Триггеры

10:50

11:00

Т 37,6

Т 38,6

ЦКС

Тахикардия, CO2, анурия, лактат ацидоз

Перевод в ОРИТ


14:00

16:00

Экстубация трахеи

Последовательность событий








- С 2009 года
- Возраст от 3 до 71 года
- 25 пациентов
- 7 получили дантролен
- 7 летальных исходов

Регистр ЗГ РФ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

