

Регионарная цитратная антикоагуляция при проведении ПЗПТ

Захарченко Игорь Анатольевич

Зав. Центра анестезиологии и реанимации ГKB им Ф. И. Иноземцева,
г. Москва

К.м.н. доцент кафедры сочетанных и комбинированных повреждений
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России.

«Начало клинического применения РЦА при ПЗПТ»

- 1990 — Ravindra Mehta и соавт.
Одно из первых клинических применений регионарной цитратной антикоагуляции (РЦА) при CAVHD — непрерывном артериовенозном гемодиализе.
- 2010 — Т. В. Мухоедова и соавт., Новосибирск
«Регионарная цитратная антикоагуляция при продолженной гемофильтрации у кардиохирургических больных», журнал *«Анестезиология и реаниматология»*
37 кардиохирургических пациентов; продолжительность ПЗПТ — в среднем около 68 ч, максимально — 18 суток.
Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. Е. Н. Мешалкина.
- 2010 — Е. Н. Архипов, Н. В. Утц, Ю. И. Тюрников, Москва
«Цитратная антикоагуляция в комплексном лечении тяжёлобольных с применением экстракорпоральной непрерывной коррекции гомеостаза».
10 пациентов с тяжёлой ожоговой травмой, 18 сеансов CVVH.
Ожоговый центр ГKB № 36, Москва. Материалы III съезда комбустиологов России, 2010.

Приемущества регионарной цитратной антикоагуляции

Management of regional citrate anticoagulation for continuous renal replacement therapy: guideline recommendations from Chinese emergency medical doctor consensus

Shu-Yuan Liu^{1†}, Sheng-Yong Xu^{2†}, Lu Yin^{3†}, Ting Yang⁴, Kui Jin⁵, Qiu-Bin Zhang⁶, Feng Sun⁷, Ding-Yu Tan⁸, Tian-Yu Xin¹, Yu-Guo Chen^{9,10,11*}, Xiao-Dong Zhao^{12*}, Xue-Zhong Yu^{2*}, Jun Xu^{2*} and Emergency Medical Doctor Branch of the Chinese Medical Doctor Association

- Меньшая частота геморрагических осложнений
- Меньше частота тромбоза фильтра, соответственно:
 - Эффективная доставка терапевтической дозы
 - Меньше трансфузий
 - Экономическая выгода
- Позволяет избежать связанных с гепарином осложнений, включая гепарин-индуцированную тромбоцитопению.


Однако имеется риск цитрат- ассоциированных осложнений, особенно у пациентов со сниженным метаболизмом цитрата — при дисфункции печени, гипоперфузии тканей вследствие шока или митохондриальных нарушениях.

Metabolic complications of citrate anticoagulation in continuous renal replacement therapy (CRRT): a Delphi consensus on indications, monitoring and management. Jacobs R, Schneider A, Hoste E, et al. *Critical Care*. 2026.



(Метаболические осложнения регионарной цитратной антикоагуляции при непрерывной заместительной почечной терапии: Delphi-консенсус по показаниям, мониторингу и тактике ведения).

- Хотя тяжёлая дисфункция печени и шок традиционно рассматривались как противопоказания, **у этих пациентов РЦА может применяться** с осторожностью при усиленном мониторинге и адаптации дозы цитрата.
- Мониторинг кальция. Измерение ионизированного кальция после фильтра необходимо для оценки эффективности РЦА, а отношение общего кальция к ионизированному служит чувствительным ранним маркером накопления цитрата.
- **Метаболический алкалоз**, электролитные нарушения и гипернатриемия являются значимыми, **но управляемыми осложнениями**; параметры ПЗПТ следует индивидуализировать.
- Первой реакцией на подозрение на накопление цитрата должно быть снижение цитратной нагрузки путём изменения параметров ПЗПТ; при персистирующих нарушениях следует перейти на альтернативную стратегию антикоагуляции.

Механизм цитратной антикоагуляции




Механизм цитратной антикоагуляции



Метаболизм цитрата

Management of regional citrate anticoagulation for continuous renal replacement therapy:
guideline recommendations from Chinese emergency medical doctor consensus

Shu-Yuan Liu^{1†}, Sheng-Yong Xu^{2†}, Lu Yin^{3†}, Ting Yang⁴, Kui Jin⁵, Qiu-Bin Zhang⁶, Feng Sun⁷, Ding-Yu Tan⁸,
Tian-Yu Xin¹, Yu-Guo Chen^{9,10,11*}, Xiao-Dong Zhao^{12*}, Xue-Zhong Yu^{2*}, Jun Xu^{2*} and Emergency Medical
Doctor Branch of the Chinese Medical Doctor Association




Цитрат метаболизируется через цикл Кребса в печени,
скелетных мышцах и почках с образованием
бикарбоната натрия.

Схема цитратной антикоагуляции

Management of regional citrate anticoagulation for continuous renal replacement therapy:
guideline recommendations from Chinese emergency medical doctor consensus

Shu-Yuan Liu^{1†}, Sheng-Yong Xu^{2†}, Lu Yin^{3†}, Ting Yang⁴, Kui Jin⁵, Qiu-Bin Zhang⁶, Feng Sun⁷, Ding-Yu Tan⁸,
Tian-Yu Xin¹, Yu-Guo Chen^{9,10,11*}, Xiao-Dong Zhao^{12*}, Xue-Zhong Yu^{2*}, Jun Xu^{2*} and Emergency Medical
Doctor Branch of the Chinese Medical Doctor Association





Осложнения регионарной цитратной антикоагуляции

- Citrate accumulation/накопление цитрата
- Net citrate overload/избыточная нагрузка цитратом
- Гипокальциемия
- Гипомагниемия

Citrate accumulation/накопление цитрата

Complications of regional citrate anticoagulation: accumulation or overload? Antoine G. Schneider, Didier Journois and Thomas Rimmelé

- Гипокальциемия
- Метаболический ацидоз (лактат\ацидоз: $\uparrow A_{tot}$, $\downarrow SID$)



Citrate accumulation/накопление цитрата

Причины

- Гипоперфузия!

При циркуляторном шоке доставка кислорода к клеткам может снижаться, что уменьшает активность цикла Кребса вследствие нарушения митохондриального окислительного метаболизма

Клиренс лактата за 12 часов $<24,3\%$ лучше предсказывал риск накопления, чем исходный уровень лактата

- Тяжёлая печёночная недостаточность

повышенный лактат сыворотки ($\geq 3,4$ ммоль/л) и сниженное протромбиновой активности ($\leq 26\%$) обладают хорошей чувствительностью и специфичностью для выявления пациентов с риском накопления цитрата

Citrate accumulation/накопление цитрата

Верификация

- Повышенное соотношение общего кальция к ионизированному кальцию ($\text{Ca total} / \text{iCa}^{2+}$), $> 2,5$
- Увеличение потребности в кальциевой инфузии
- Нарастающий ацидоз (лактат +)

Устранение

- Уменьшить дозу цитрата: снизить скорость кровотока(незамедлительно)
- Снизить целевую дозу цитрата ($\text{pf-iCa} < 0,4$ ммоль/л)
- Увеличить скорость потока диализата (незамедлительно):
- Обеспечить адекватность перфузии (волемиа, катехоламины, ЭКМО)

Shock protocol:

- *минимальный кровоток 80-100 мл/мин*
- *снижение целевой дозы цитрата для поддержания $\text{pf-iCa} < 0,4$ ммоль/л*
- *увеличения потока эффлюента до 38-42 мл/кг/ч, что позволяет провести экстракцию цитрата $> 70-75\%$*

Citrate accumulation/накопление цитрата

Пациентка 25 лет, Дз: Синдром длительного сдавления. Острая печёночная недостаточность (билирубин 100 мкмоль/л, ПТА < 40%, фибриноген 1 г/л), Острая почечная недостаточность.

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• pH = 7,3• pCO₂ = 36• BE = -7• Лактат = 0,9• iCa = 0,56• Catotal = 2,09• Catotal/iCa > 2,5• Рост потребности в инфузии Ca |  | <ul style="list-style-type: none">• pH = 7,34• pCO₂ = 35• BE = -1,9• Лактат = 1,0• iCa = 0,96• Catotal = 1,87• Catotal/iCa < 2,5• Снижение потребности в инфузии Ca |
|---|---|--|


Лечебный манёвр:

- увеличение скорости диализата с 30 мл/кг (2000 мл) до 50 мл/кг (3000 мл)
- Снижение целевой дозы цитрата с 4 ммоль/л до 2 ммоль/л

Net citrate overload/избыточная нагрузка цитратом

Верификация


- Метаболический алкалоз (Причина: $\uparrow \text{OH}^-$ $\rightarrow$ $\uparrow \text{HCO}_3^-$ (как следствие))
- Нормальное соотношение общего кальция к ионизированному кальцию
($\text{Ca total} / \text{Ca}^{2+}$), $< 2,5$



Net citrate overload/избыточная нагрузка цитратом

Устранение

- Уменьшить дозу цитрата: снизить скорость кровотока, снизить целевую дозу цитрата, снизить дозу Ca?



- Увеличить скорость потока диализата (CVVHD).

Случай №1, мужчина 55 лет. 78 кг. ОПП.

Параметры CVVHD

- поток крови 100 мл/мин
- Диализат 2200 мл/ч
- Цитрат 3.8 ммоль/л
- Кальций 1.8 ммоль/л

BE - избыток оснований	8,2	ммоль/л	1,5 - 3
сHCO ₃ — концентрация бикарбоната — ацидоза/алкалоза	31,0	ммоль/л	20 - 24
pH — кислотно-основное состояние крови	7,419	усл.ед.	7,35 - 7,45
Ca ²⁺ — концентрация ионов кальция в крови	1,45		
Na ⁺ — концентрация ионов натрия в крови	153		
Cl ⁻ — концентрация ионов хлора в крови	102		
K ⁺ — концентрация ионов калия в крови	4,5		
Кальций общий	2,81		


КОРРЕКЦИЯ

Параметры ПЗПТ

- Кальций 1 ммоль/л
- Цитрат 3 ммоль/л
- Диализат 3600
- Поток 90 мл/мин

BE - избыток оснований	3,8	ммоль/л	1,5 - 3
сHCO ₃ — концентрация бикарбоната — ацидоза/алкалоза	27,1	ммоль/л	20 - 24
pH — кислотно-основное состояние крови	7,417	усл.ед.	7,35 - 7,45
Ca ²⁺ — концентрация ионов кальция в крови	1,01		
Na ⁺ — концентрация ионов натрия в крови	138		
Cl ⁻ — концентрация ионов хлора в крови	98		
K ⁺ — концентрация ионов калия в крови	4,8		


Случай №2, женщина 27 лет, 60 кг. ОПП,
 CVVHDF, скорость кровотока **150** мл/мин, целевой цитрат **4,2**
 ммоль/л, Са **2,3** ммоль/л
 КЩС: pH = 7,64, BE= 26,5, pCO2= 55, iCa=0,2, iCa=1,75




Случай №2, женщина 27 лет, 60 кг. ОПП.

Коррекция

- Уменьшить скорость кровотока ~~150~~ → 100 мл/мин.
- Увеличить скорость диализата
- Уменьшить целевую дозу цитрата после снижения дозы восполнения Ca



Случай №3 женщина 43 лет, 65 кг. ОПП,
CVVHDF, скорость кровотока **150** мл/мин, целевой
 цитрат **4,4** ммоль/л, Са **2,1** ммоль/л
 КЩС: pH = 7,54, BE= 16,1, pCO₂= 62, iCa=0,14,
 iCa=1,45




Случай №3, женщина 43 лет, 65 кг, ОПП,
CVVHDF, скорость кровотока **150** мл/мин, целевой цитрат **4,4**
ммоль/л, Са **2,1** ммоль/л
Коррекция

Уменьшить скорость кровотока ~~150~~ → 100 мл/мин.

Увеличить скорость диализата

Уменьшить целевую дозу цитрата после снижения дозы
восполнения Са



Гипокальциемия, Гипомагниемия

Причины:

- Накопление цитрата
- Недостаточное восполнение Са, Mg.

Ключевые моменты безопасной регионарной цитратной антикоагуляции

- Осторожно у пациентов с шоком и печёночной недостаточностью (мониторинг+персонализация)
- Обеспечение адекватной перфузии
- Низкая скорость кровотока (100-120 мл/мин)
- CVVHD
- iCa в контуре 0,25-0,3 ммоль/л (0,4 ммоль/л)
- iCa в организме 0,9-1,1 ммоль/л
- Соотношение общего кальция к ионизированному кальцию ($Ca\ total / iCa^{2+}$), $< 2,5$ (ежедневно)
- Соблюдение временного интервала контроля КЩС и электролитов (30 мин, 2ч-4, 4ч-4, 6ч-4)
- Растворы, «адаптированные к цитрату»
- Контроль Mg (ежедневно) и его восполнение

Metabolic complications of citrate anticoagulation in continuous renal replacement therapy (CRRT): a Delphi consensus on indications, monitoring and management. Jacobs R, Schneider A, Hoste E, et al. *Critical Care*. 2026.

Multidisciplinary guidelines on renal replacement therapy in intensive care medicine Melanie Meersch-Dini, Mariam Abu-Tair. 2026.

KDIGO 2026 CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR ACUTE KIDNEY INJURY (AKI) AND ACUTE KIDNEY DISEASE (AKD) 2026 (проект)

Ключевые положения

Регионарная цитратная антикоагуляция (РЦА) обладает существенными преимуществами перед системной антикоагуляцией гепарином — прежде всего за счёт снижения риска кровотечений и увеличения срока службы экстракорпорального контура.

Шок и печёночная недостаточность не являются противопоказаниями к РЦА. Её применение возможно при условии тщательного мониторинга

При проведении ПЗПТ не доказано клинических преимуществ конвективного транспорта перед диффузионным.

Статистика ПЗПТ и ЦРА в ГКБ им Ф.И.
Иноземцева за 2025 год.


Количество процедур CVVHD: 945, 160 пациентов/ в ср.144 ч.

Количество ЦРА: 945

Количество случаев перехода на гепарин: 0

Типичные настройки аппарата





Спасибо за внимание

Захарченко Игорь Анатольевич. +79059267161

Зав. Центра анестезиологии и реанимации ГKB им Ф. И. Иноземцева,
г. Москва

К.м.н. доцент кафедры сочетанных и комбинированных повреждений
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России.