



ИНФЕКЦИОННАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №1

СИНДРОМ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ, ВЫЗВАННЫЙ ИНФЕКЦИЕЙ (ITES), В ПРАКТИКЕ ИНФЕКЦИОНИСТА И АНЕСТЕЗИОЛОГА- РЕАНИМАТОЛОГА

Сохликов Алексей Александрович
Руководитель центра
анестезиологии-реаниматологии
ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ», врач
анестезиолог-реаниматолог,
Гусева Галина Дмитриевна
Заведующий инфекционным
отделением для детей
с нейроинфекциями и
менингитом №11 ГБУЗ «ИКБ №1
ДЗМ», врач-инфекционист

МОСКВА 2026

ОСТРАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Определение

Острая энцефалопатия — патобиологический процесс в головном мозге, развивающийся остро и характеризующийся нарушением сознания и/или изменением психического состояния.



Причины

Термин относится к клиническому состоянию, а не к заболеванию.

Основные причины:

- метаболические
- гипоксически-ишемические
- аутоиммунные / иммуноопосредованные энцефалопатии
- лекарственная интоксикация



Особенности в педиатрии

В педиатрии острая энцефалопатия часто является вторичной по отношению к инфекции.

ЭНЦЕФАЛИТЫ



ИНФЕКЦИОННЫЙ
ЭНЦЕФАЛИТ



аутоиммунный энцефалит



ITES

ИНФЕКЦИЯ

```
graph TD; A(ИНФЕКЦИЯ) --> B(Энцефалит); A --> C("ITES —  
параинфекционный энцефалит  
(инфекция всё ещё присутствует)"); A --> D("Аутоиммунный /  
иммуноопосредованный  
энцефалит (постинфекционный)");
```

Энцефалит

ITES —
параинфекционный энцефалит
(инфекция всё ещё присутствует)

Аутоиммунный /
иммуноопосредованный
энцефалит (*постинфекционный*)

ЭНЦЕФАЛИТ: КЛИНИКО-ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ


Энцефалит — это воспаление головного мозга. Острый энцефалит, связанный с вирусными инфекциями, включает в себя два различных клинико-патологических заболевания.

Форма, называемая просто острым вирусным энцефалитом, представляет собой прямое заражение нервных клеток с периваскулярным воспалением, разрушением нейронов, нейронофагией и некрозом тканей, и эта патология сосредоточена главным образом в сером веществе.



ВРОЖДЁННЫЙ И АДАПТИВНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ

Два взаимосвязанных контура защиты: быстрый неспецифический и высокоспецифический с памятью



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Врождённый ответ запускает презентацию антигена; антитела усиливают фагоцитоз и активацию комплемента.

ЛЕГЕНДА PRR — pattern recognition receptors — рецепторы распознавания паттернов PAMP — патоген-ассоциированные молекулярные паттерны АПК — антиген-презентирующая клетка НК — естественные киллеры МНС — главный комплекс гистосовместимости

■ врождённый путь

■ адаптивный путь

➡ направление ответа

ПАТОГЕНЕЗ ITES



ITES: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

Критерии клинической оценки при подозрении на infection-triggered encephalopathy syndromes

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

Обязательные критерии

- 1 **Лихорадка** возникает в течение недели до первых неврологических проявлений.
- 2 **Лихорадка сохраняется** на фоне неврологических симптомов.
- 3 **Клинические проявления >24 ч:** снижение сознания, изменение психического состояния, вялость.

ПОДТВЕРЖДАЮТ

Дополнительные / возможные

- 1 **Нейрорадиологические аномалии**, специфичные для конкретного синдрома.
- 2 **ЭЭГ:** замедление фоновой активности.
- 3 **Ликвор: неоптерин / провоспалительные цитокины** ↑ без плеоцитоза.

! Важно: исключить

- **Энцефалит** — инфекционный / аутоиммунный
- **Метаболические причины** — в т. ч. синдром Рейе
- **Неконвульсивный** — эпилептический статус
- **Токсические / травматические** — поражения ЦНС



КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ОСТРЫХ ЭНЦЕФАЛОПАТИЙ

С выраженными структурными повреждениями

AESD



Острая энцефалопатия с двухфазными судорогами и поздним снижением диффузии

ANE



Острая некротизирующая энцефалопатия

MERS



Легкая энцефалопатия с обратимым поражением мозолистого тела

AFCE



Острый молниеносный отек головного мозга

Эпилептические энцефалопатии

FIRES



Синдром рефрактерной эпилепсии, вызванной лихорадкой

NORSE



Синдром суперрефрактерной эпилепсии, вызванной лихорадкой

HNE



Синдром эпилепсии с гемиконвульсиями и гемиплегией

ACEM



Острый шок с энцефалопатией и СПОН

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭНЦЕФАЛИТОВ: ТЭС VS ИНФЕКЦИОННЫЙ VS АУТОИММУННЫЙ

■ ITES

■ Инфекционный

■ Аутоиммунный

ПАРАМЕТР	ITES	ИНФЕКЦИОННЫЙ	АУТОИММУННЫЙ
Dx Примеры заболеваний	ANE, MERS, AESD, AFCE, ACEM	Герпетический энцефалит	Анти-NMDAR, ADEM
Ψ Патофизиология	Цитокиновый шторм ; повреждение ГЭБ без клеточной инфильтрации	Прямая нейроинвазия + воспалительная инфильтрация	Иммунная инфильтрация (инфекция/опухоль); без патогена в ЦНС
T° Предшествующая лихорадка	Обязательна ; до неврологических симптомов	Частая инфекционная продрома	Вариабельна; чаще постинфекционная
! Энцефалопатия	Выраженная	Выраженная	Выраженная
Ab Антинейрональные антитела	Отсутствуют	Обычно отсутствуют	Положительные при серопозитивном АИЭ
CSF Плеоцитоз ликвора	Редко / слабо	Присутствует	Часто присутствует
OCB / патоген в ликворе	OCB –; патоген крайне редко	OCB ±; патоген обычно выявляется*	OCB ±; патоген очень редко
EEG ЭЭГ	Замедление ± эпилептиформная активность	Замедление ± эпилептиформная активность	Замедление ± эпилептиформная активность
MRI МРТ: локация и симметрия	Синдром-специфично : таламусы (ANE), splenium (MERS), субкортикальное БВ (AESD). Обычно симметрично	Кора/подкорка, серое и белое вещество. Обычно асимметрично	Вариабельно; может быть норма. Чаще асимметрично
DWI Ограничение диффузии DWI/ADC	Характерно	Возможно (особенно HSV)	Редко

* Отрицательная ранняя ПЦР не исключает HSV

КЛЮЧЕВЫЕ БИОМАРКЕРЫ ДИАГНОСТИКИ ITES

Инфекционно-токсический энцефалопатический синдром: мультибиожидкостный подход к диагностике

Моча

Неинвазивный



Клиническая значимость: маркеры раннего нарушения энергетического метаболизма и деградации гликокаликса; подходят для массового скрининга

Кровь


Мин. инвазивный



Клиническая значимость: профиль ацилкарнитинов отражает митохондриальную дисфункцию и нарушение β -окисления жирных кислот при системном воспалении

Спинномозговая жидкость


Инвазивный



Клиническая значимость: провоспалительные цитокины — прямые маркеры нейровоспаления и повреждения нейронов, высокая прогностическая ценность при тяжелых формах ITES.

! IL-6 демонстрирует максимальную диагностическую точность среди всех изученных маркеров ($AUC > 0.9$)

Диагностический алгоритм (последовательность обследования)



Принцип: от неинвазивных методов к инвазивным по клиническим показаниям. Маркеры мочи — раннее выявление; ацилкарнитины крови — подтверждение; цитокины ликвора — оценка степени поражения ЦНС.

Клинический случай: ITES

Инфекционно-токсическая энцефалопатия у ребёнка 7 лет
на фоне острого пансинусита

ПАЦИЕНТ



С.Е.

пациент (данные обезличены)



7 лет

дата рождения 14.03.2018



Рост 110 см • масса 30,8 кг

ИМТ 25,5 кг/м² • ППТ 0,97 м²



ИКБ №1 ДЗМ, Москва

ОРИТ №1: 03–07.05.2025 • отд. нейроинфекций №11: 11–26.06.2025



G04.9 — энцефалит

клиническая картина ITES; фон: PAC (F84.02)

О СЛУЧАЕ

Острое начало (21–22.04.2025) с респираторного синдрома и лихорадки до 39 °С на фоне двустороннего гайморита и этмоидита.

За 11 суток — прогрессирование: угнетение сознания, тонические судороги, дыхательная недостаточность с переводом на ИВЛ.



Диагностирован менингоэнцефалит с лимфоцитарным плеоцитозом ликвора (313/мкл); на фоне пульс-терапии ГКС и ВВИГ — положительная динамика, выписка с улучшением 26.06.2025.



Хронология заболевания: от ОРВИ-подобного начала до ИВЛ

21.04 – 07.05.2025 • маршрут: дом → КОКДБ → ТГКБСМП → ИКБ №1

21–22.04

Начало

Насморк, однократный
подъём t до 38,6 °C

29.04

Госпитализация

ЛОР-отделение КОКДБ:
цефтриаксон,
дексаметазон

02.05

Судороги, сопор

Сибазон; ИВЛ; МРТ:
множественные очаги
изменённого сигнала

06–07.05

Пульс-терапия

Метилпреднизолон 750
мг/сут; перевод в МГДКБ

1

2

3

4

5

6

7

27.04

Лихорадка 39 °C

Цефалгия, рвота ×2; РКТ:
двусторонний гайморит,
этмоидит

30.04

Угнетение сознания

Вялость, сонливость →
подозрение на менингит;
Лц $20,4 \times 10^9/\text{л}$
В ЦСж 5 клеток, белок
норма

03.05

ИКБ №1, ОРИТ

ЛП: цитоз 313/мкл,
лимфоциты 91 %; ИВЛ +
седация

11 суток

от первых симптомов до перевода на ИВЛ (21.04 → 02.05)

3 суток

от госпитализации до перевода в ОРИТ (29.04 → 02.05)

Первые симптомы – лихорадка, насморк

Ключевые клинические проявления

Период 22.04–02.05.2025 (до перевода в ИКБ №1)



Лихорадка

До 39,0–39,5 °С, повторные подъёмы 27 и 29.04

ХАРАКТЕРНО



Головная боль

Цефалгия с 27.04 — до угнетения сознания

МОЖЕТ БЫТЬ



Рвота

2 эпизода 27.04, без связи с приёмом пищи

МОЖЕТ БЫТЬ



Судороги

Тонические в верхних конечностях (02.05); купированы сибазоном

ХАРАКТЕРНО



Угнетение сознания

Вялость (30.04) → сопор (02.05); RASS –3 на фоне седации

ХАРАКТЕРНО



Дыхательная недостаточность

ИВЛ с 02.05 (SIMV, FiO₂ 35 %); интубация

МОЖЕТ БЫТЬ



Спастический гипертонус

Тонус по пирамидно-экстрапирамидному типу; с-м Бабинского слева, клонус стоп

МОЖЕТ БЫТЬ



Менингеальный синдром

Не выявлен на всём протяжении; преобладала очаговая симптоматика

ХАРАКТЕРНО

Фон: расстройство аутистического спектра (F84.02), гипертрофия аденоидов II ст.; аллергия на амоксициллин + клавулановую кислоту (кожные высыпания) в анамнезе.

Лабораторная диагностика: показатели крови

ОРИТ ИКБ №1 • 03.05–06.05.2025

Показатель	30.04.26	03.05.2025	06.05.2025	Референс
Лейкоциты, ×10 ⁹ /л	20,4	19,97	8,27	4,27–11,4
Нейтрофилы абс., ×10 ⁹ /л	18,9	18,49	7,13	1,63–7,87
Нейтрофилы, %	93	92,6	86,3	40–60
Лимфоциты абс., ×10 ⁹ /л		0,94	1,01	0,97–4,28
Лимфоциты, %		4,7	12,2	19–45
Тромбоциты, ×10 ⁹ /л	267	584	362	154–400
СОЭ, мм/ч	36	36	—	2–10
СРБ, мг/л	3	2,6	<2,0	0–5
Прокальцитонин, нг/мл		0,052	—	0–0,5
Фибриноген, г/л	-	4,97	—	2,38–4,98
МНО	-	1,44	—	0,8–1,2
Глюкоза, ммоль/л	-	7,8	6,2	3,3–6,6

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

- Нейтрофильный лейкоцитоз с лимфопенией — системный воспалительный ответ
- СРБ и прокальцитонин в пределах нормы — низкая вероятность бактериального сепсиса
- Реактивный тромбоцитоз и стрессовая гипергликемия (7,8 → 12,6 ммоль/л)
- Транзиторные изменения коагулограммы (МНО 1,44) — без клинических проявлений
- К 06.05: лейкоциты 8,27, тромбоциты 362 — нормализация на фоне терапии


ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА

- красный — выше референса
- синий — в пределах нормы
- жёлтый — пограничное значение

Спинномозговая жидкость: плеоцитоз и его динамика

Люмбальные пункции: 03.05.2025 (ИКБ №1) и 17.06.2025 (отд. №11)

Показатель	30.04	03.05.2025	17.06.2025	Референс
Цитоз, $\times 10^6/\text{л}$	6	313	5	0–10
Лимфоциты, %	94	91	14	40–80
Белок, г/л	0,4	0,31	0,19	0,15–0,45
Глюкоза, ммоль/л	2,4	5,5	2,5	2,2–3,9
Лактат, ммоль/л	1,5	2,2	1,6	1,1–2,4



ИСКЛЮЧЁН ШИРОКИЙ КРУГ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ (ПЦР ЦСЖ, ИФА, посевы)

ПЦР ЦСЖ: ВПГ 1/2, ВВЗ, ЭБВ, ЦМВ, ВГЧ-6, энтеро-, респираторные вирусы — отр.

Антигены бактериальных менингитов (*N. meningitidis*, *S. pneumoniae*, *H. influenzae* и др.) — отр.

ИФА: ВИЧ, сифилис, боррелии, вирус клещевого энцефалита — отр.

Антинейронная панель, АТ к аквапорины-4 и ганглиозидам — отр.

Олигоклональные АТ в ЦСЖ — 1-й тип секреции (положительно)

Вывод: лимфоцитарный плеоцитоз 313/мкл на 8 день от появления неврогической симптоматики, при отрицательном инфекционном скрининге и наличии олигоклональных АТ — аргумент в пользу иммунного (аутоиммунного) генеза поражения ЦНС.

Сравнение «норма vs патология»: сводка исследований

МРТ 02.05, 17.05 и КТ 03.05.2025 • ЭЭГ и ЭНМГ

Структура	Норма	Пациент (02–17.05.2025)
Белое вещество	Однородный МР-сигнал	Субтотальный отёк; множественные очаги изменённого сигнала
Базальные ядра	Без изменений	Отёк, признаки интенсификации (17.05)
Желудочки	Симметричны, не расширены	Симметричны; тенденция к компрессии
Борозды, САП	Обычной ширины	Расширены — атрофические изменения (КТ)
Сосуды	Без особенностей	Венозная дисплазия левой лобной доли; микроангиопатия
Околоносовые пазухи	Пневматизированы	Утолщение слизистой ВЧП и этмоидальных ячеек



МРТ ГМ 02.05 (ТГКБСМП)

Множественные зоны изменённого МР-сигнала в гемисферах, вероятно, воспалительного генеза



МРТ ГМ 17.05 (МГДКБ)

Положительная динамика: регресс цитотоксических изменений и отёка; сохраняется отёк базальных ядер



КТ ГМ 03.05 (ИКБ №1)

Микроангиопатия, сосудистые очаги; атрофические изменения; утолщение слизистой пазух



ЭНМГ 21.05 (МГДКБ)

Аксональная моторно-сенсорная полинейропатия (критических состояний)




ЭЭГ 23.05 (МГДКБ)

Типичной эпилептиформной активности не обнаружено




МРТ ШОП

Без патологии



**Зоны
гиперинтенсивного
сигнала
демонстрируют
истинное
ограничение
диффузии по
данным карт ADC**



Сливные зоны гиперинтенсивного сигнала от серого и белого вещества головного мозга на T2-ВИ и T2-FLAIR в обеих гемисферах: в лобных, левой затылочной и височных долях

В динамике:
03.05.2025: множественные зоны изменённого МР-сигнала в гемисферах (вероятнее-воспалительный генез)

17.05.2025: положительная динамика — регресс цитотоксических изменений, умеренный регресс отёка полушарий при сохранении отёка базальных ядер

Хронология лечения: шесть этапов

27.04 – 26.06.2025 • ГКС-пульсы и ВВИГ — основа иммунотерапии

Этап 1 • 27.04–02.05

Догоспитальный этап — КОКДБ → ТГКБСМП

Эмпирическая АБТ (цефтриаксон, цефоперазон), дексаметазон; сибазон при судорогах; перевод на ИВЛ

Этап 2 • 03–07.05

ИКБ №1, ОРИТ №1 — реанимация

ИВЛ (BiLevel) + седация мидазоламом; цефтриаксон 1 г ×2; вальпроевая кислота 200 мг/сут в/в; маннитол; пульс-терапия метилпреднизолоном 750 мг/сут (06–07.05)

Этап 3 • 07–28.05

МГДКБ — продолжение иммунотерапии

Пульс-терапия мПЗ 750 мг/сут (суммарно 10 доз); ВВИГ 15 г; трахеостомия 21.05; МРТ 17.05 — положительная динамика

Этап 4 • 28.05–10.06

ИКБ №1 → ДГКБ №9 — реабилитация

ЛФК, массаж; попытка деканюляции — трахеостома оставлена (бульбарный синдром, риск аспирации)

Этап 5 • 11–26.06

ИКБ №1, отд. №11 — нейроинфекции

ЛФК, массаж; вальпроевая кислота 625 мг ×2/сут; повторная пульс-терапия мПЗ 800 мг/сут (18–23.06); ботулотоксин А 100 ЕД (19.06); ЛП 17.06 — ликвор в норме

Этап 6 • 26.06

Выписка — амбулаторный этап

Состояние средней тяжести, положительная динамика; продолжение реабилитации

Применённые препараты: дозировки и схемы




Категория	Препарат	Дозировка / путь введения	Период	Показание
Иммунотерапия	Метилпреднизолон	750 мг/сут в/в (пульс); повторный курс 800 мг/сут №6	06–07.05 • 07–11.05 • 18–23.06	Иммунное воспаление ЦНС
Иммунотерапия	Иммуноглобулин человека нормальный	15 г в/в, однократно	май 2025 (МГДКБ)	ВВИГ при энцефалите
Антибактериальная	Цефтриаксон	1 г ×2/сут в/в	03–07.05	Эмпирическая АБТ
Противосудорожная	Вальпроевая кислота	200 мг/сут в/в инфузия → 625 мг ×2/сут внутрь	03.05–27.06	Судорожный синдром
Седация	Мидазолам	0,05 мг/кг/ч в/в (инфузомат)	03–07.05	Седация на ИВЛ
Противоотёчная	Маннитол	100 мл (150 мг/мл) в/в	03–07.05	Отёк головного мозга
Симптоматическая	Ботулинический токсин типа А	100 ЕД в/м (в слюнные железы)	19.06	Гиперсаливация
Вспомогательная	Левокарнитин, домперидон, омепразол	500 мг ×2; 5 мг ×3; 10 мг ×1/сут внутрь	12–27.06	Метаболическая и гастропротективная поддержка

Немедикаментозная терапия: ИВЛ (BiLevel, далее самостоятельное дыхание через трахеостому от 21.05), зондовое питание, ЛФК с инструктором, массаж, психолого-педагогическое сопровождение.

Динамика состояния на фоне терапии

03.05 – 26.06.2025 • зелёная зона — референсные значения

Динамика лабораторных показателей (норма — зелёная зона)



Сознание

RASS -3 (седация) → ясное с 07.05, отмена седации

Дыхание

ИВЛ → самостоятельное дыхание через трахеостому (с 21.05)

МРТ 17.05

Регресс цитотоксических изменений, уменьшение отёка

Ликвор 17.06

Цитоз 5/мкл, белок 0,19 г/л — в пределах нормы

Исход госпитализации: положительная динамика

Выписка 26.06.2025 из ИКБ №1 (отд. №11)



Сознание ясное

ориентация сохранена; афебрилитет; SpO₂ 98 % на атмосферном воздухе (через трахеостому)



Моторный прогресс

сидит самостоятельно до 40 мин, опора на ноги, до 5 шагов с поддержкой



Ликвор нормализован

цитоз 5/мкл, белок 0,19 г/л (17.06.2025); отрицательная антинейрональная панель



Сохраняются

бульбарный синдром, центральный тетрапарез (сила 2,5–4,5 балла), гиперсаливация, зондовое питание



Трофические нарушения


пролежни в стадии эпителизации; крупнопластинчатое шелушение кожи стоп и голеней



Перспектива

деканюляция трахеостомы после купирования бульбарного синдрома; расширение двигательного режима

Функциональное восстановление



КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ ДИНАМИКИ

Цитоз ЦСЖ	313 → 12 → 5 ×10 ⁶ /л
Лейкоциты	19,97 → 8,27 ×10 ⁹ /л
Тромбоциты	584 → 362 ×10 ⁹ /л
Температура	39,0 → 36,6 °С (афебрилитет)
СОЭ / СРБ	36 мм/ч → норма; 2,6 → <2,0 мг/л

Прогноз и рекомендации по дальнейшему наблюдению

ПРОГНОЗ



Для жизни — благоприятный

афебрилитет, стабилизация витальных функций, положительная динамика на фоне иммунотерапии



Восстановительный период

ориентировочно 6–12 месяцев и более; высокий потенциал нейропластичности в детском возрасте



Риск остаточного дефицита

двигательные нарушения (тетрапарез), речевые и когнитивные расстройства, эпилептиформная активность



Фоновое РАС

определяет особенности реабилитационного маршрута и прогноз социальной адаптации

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ

- Осмотр невролога и педиатра — каждые 1–3 месяца в течение первого года
- Повторная МРТ ГМ через 3–6 месяцев (контроль отёка базальных ядер)
- ЭЭГ и ЭНМГ в динамике (оценка полинейропатии, эпилептиформной активности)
- Вальпроевая кислота — под контролем концентрации в крови; коррекция дозы
- Деканюляция трахеостомы после купирования бульбарного синдрома (ЛОР)
- Поэтапный перевод с зондового на пероральное питание (логопед, диетолог)
- ЛФК, массаж, физиотерапия, эрготерапия, психолого-педагогическое сопровождение
- Индивидуальный календарь прививок после консультации; исключение контактов с инфекциями
- При признаках обострения (лихорадка, судороги, регресс навыков) — экстренная госпитализация

Ключевые выводы



Ранняя настороженность

Лихорадка + синусит + угнетение сознания у ребёнка → экстренно исключать нейроинфекцию: МРТ ГМ и люмбальная пункция



Ключевая находка

Лимфоцитарный плеоцитоз ЦСЖ 313/мкл при отрицательном инфекционном скрининге и олигоклональных АТ — иммунный генез поражения



«Тихие» маркёры

Нормальные СРБ и прокальцитонин при выраженном лейкоцитозе — против бактериального сепсиса; не «успокаивают» клиническую картину



Своевременная терапия

**ПУЛЬС-ТЕРАПИЯ: : метилпреднизолон
ВВИГ**

НЕЙРОПОТЕКЦИЯ: поддержание церебральной перфузии и оксигенации,

- - Противосудорожная терапия
- - Поддержание целевой температуры/гипотермия
- Имуномодуляция (МАТ: Анакинра, Тоцилизумаб?)



Мультидисциплинарная команда


Реаниматолог, инфекционист, невролог, ЛОР, реабилитолог, психолог — на всех этапах маршрутизации



Долгосрочное наблюдение

Реабилитация 6–12 месяцев и более, диспансерное наблюдение, контроль МРТ/ЭЭГ/ЭНМГ — определяют функциональный исход

ВИДЕО: РЕЗУЛЬТАТ РЕАБИЛИТАЦИИ





ИНФЕКЦИОННАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №1

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!